



## #EscuchaMisPulmones, la campaña para acercar la FPI a médicos de Atención Primaria y facilitar su diagnóstico precoz

Con motivo de la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), la Asociación Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) ha lanzado la campaña #EscuchaMisPulmones con el objetivo de dar visibilidad a las ne...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## El diagnóstico precoz, clave en la Fibrosis Pulmonar Idiopática

La campaña #EscuchaMisPulmones, impulsada por AFEFPI y Roche Farma, quiere poner de manifiesto las necesidades de los pacientes que padecen esta enfermedad para conocer los retos en su abordaje y fomentar el conocimiento de sus síntomas entre la p...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## Más de 7.500 personas padecen Fibrosis Pulmonar Idiopática en España

Más de 7.500 personas padecen Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) en España, según datos recordados en la presentación de la campaña '#EscuchaMisPulmones', puesta en marcha con el objetivo de fomentar el conocimiento de los síntomas de esta enferme...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## La Atención Primaria es el “eslabón clave” en el diagnóstico a tiempo de la fibrosis pulmonar idiopática

Con motivo de la celebración, entre este sábado, 15 de septiembre, y el próximo 23 del mismo mes, de la Semana Internacional de la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), la Asociación Familiares y Pacientes de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI) y ...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## Diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática requiere hasta 2 años desde el primer síntoma

El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se retrasa entre uno y dos años desde la aparición del primer síntoma, según ha alertado el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI), el d...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## Alertan del retraso de diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática

Esta enfermedad se considera rara debido a su baja prevalencia, de entre 15 y 20 personas de cada 100.000 habitantes. El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se retrasa entre uno y dos años desde la aparición del primer síntoma...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática se retrasa entre uno y dos años desde el primer síntoma, según experto

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se retrasa entre uno y dos años desde la aparición del primer síntoma, según ha alertado el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmo...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online [aquí](#)



## El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática se retrasa entre uno y dos años desde el primer síntoma, según experto

El diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) se retrasa entre uno y dos años desde la aparición del primer síntoma, según ha alertado el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPPI), el d...



PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online **aquí**